

Profilaktyka raka szyjki macicy



**RAK SZYJKI MACICY ZWANY JEST
CICHYM ZABÓJCĄ
ROZWIJA SIĘ BARDZO DŁUGO I BEZOBJAWOWO.**

Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy

I. Etap podstawowy – cytologia

Etap podstawowy to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest realizowane w poradni ginekologiczno – położniczej. Materiał jest następnie przesyłany do pracowni cytologicznej w celu dokonania oceny preparatu. U kobiet nieodczuwających dolegliwości rak szyjki macicy jest najczęściej wykrywany poprzez ocenę nieprawidłowego wyniku wymazu cytologicznego.

II. Etap diagnostyczny

Etap diagnostyczny polega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologicznej wyłonionej w drodze konkursu ofert. Po zbadaniu preparatu wynik jest przesyłany do poradni, która pobrała materiał do badania.

III. Etap pogłębionej diagnostyki

Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, lekarz ginekolog – położnik stosuje odpowiednie leczenie lub kieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę, którą jest badanie kolposkopowe, wykonywane w ramach Programu. W przypadku konieczności zweryfikowania obrazu kolposkopowego, pobierane są celowane wycinki do badania histopatologicznego. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno – leczniczego: skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego.



Kto może korzystać z programu

- Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat,
- U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy,
- Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ,
- Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie,
- Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.



RSM Można wyróżnić dwa rodzaje objawów raka : wczesne i późne

Objawy wczesne:

- nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe,
- krwawienia pomenopauzalne,
- krwawienia pourazowa (po stosunkach, po irygacjach)
- cuchnące, ropne upławy.

Objawy późne :

- bóle w dole brzucha
- bóle w okolicy lędźwiowej (o charakterze kolki nerkowej)
- obrzęk kończyn (lub kończyny)
- ze strony pęcherza moczowego
- częste oddawanie moczu,
- parcie na mocz,
- zaleganie moczu w pęcherzu moczowym
- ze strony odbytnicy
- zaparcie stolca,
- ciągłe parcie na stolec, trudności w oddawaniu stolca.